

POLIVITAMÍNICOS

Nombre Comercial	Vit.B1 (tiamina)	Vit.B2 (riboflavina)	Nicotin amida	Vit.B6 (piridoxina)	d- pantotenat o cálcico	d- biotina	Vit.B12 (cianocobalamina)	Ácido fólico	Vit. C	Vit.A	Vit D3	Vit d2 Ergocalciferol	Vit E
ADC Complex (gotas) 1 gota/0,05 ml									4,17 mg/gota	416,67 UI/gota	80 UI/gota		
Anemidox ampollas	100 mg (amp.II)	0,2 mg (amp.II)	10 mg (amp.II)	5 mg (amp.II)			1 mg (amp.II)	15 mg (amp.II)					
Anemidox Ferrum¹							1 mg	7,5 mg	100 mg				
Bagó B1-B6-B12 (comp. rec.)	125 mg			140 mg			5000 µg						
Bagó B1-B6-B12 (susp)	10 mg/ml			10 mg/ml			40 µg/ml						
Bagó B1-B6-B12 (iny. – frasco ampolla)	100 mg			200 mg			10000 µg						
Becozym (grageas)	15 mg	15 mg	50 mg	10 mg	25 mg	0,15 mg	0,010 mg						
Supradyn² (comp.rec)	1,5 mg	1,7 mg	19 mg	2,2 mg	5,5 mg	0,2 mg	0,003 mg	0,1 mg	60 mg	3333 UI	300 UI		15 mg
Supradyn³ (gotas) 25 gotas/ml	2 mg/ml	1,5 mg/ml	15 mg/ml	2 mg/ml		0,2 mg/ml			80 mg/ml	3000 UI/ml		900 UI/ml	15 mg/ml
Tri – vi – flúor⁴ (gotas)									50 mg/ 0,6 ml	5000 UI/0,6 ml		1000 UI/0,6 ml	
Tri – vi – sol (gotas)									50 mg/ 0,6 ml	5000 UI/0,6 ml		1000 UI/0,6 ml	

1: Anemidox Ferrum contiene también fumarato ferroso: 330 mg.

2: Supradyn comprimidos contiene también calcio: 62,5 mg; fósforo: 62,5 mg; magnesio: 50 mg; hierro: 4,5 mg; cobre: 0,5 mg; manganeso: 0,5 mg; zinc: 3,75 mg

3: Supradyn gotas contiene también dexapantenol: 10 mg/ml; vitamina D2 (ergocalciferol): 900 UI/ml

4: Contiene también flúor: 1,1 mg/0.6 ml

NOMBRE COMERCIAL	DOSIS
ADC Complex gotas	Embarazadas y lactantes: 10 gotas, < 4 años: 3 gotas, > 4 años: 6 gotas, adultos: 12 gotas
Anemidox ampollas	La posología será establecida por el médico en función del proceso a tratar y las características del paciente. Como orientación se sugiere: 1 ampolla I y una ampolla II, juntas, por vía I.M. diariamente o día por medio, hasta lograr la remisión de la sintomatología. Esta posología podrá ser aumentada o disminuida de acuerdo a la respuesta individual o al criterio médico.
Anemidox ferrum cápsulas	Como orientación, se sugiere administrar 1 a 2 cápsulas por día antes de las comidas.
Bagó B1-B6-B12 comp. recub.	Como posología media de orientación, se aconseja: 1-2 comprimidos recubiertos por día.
Bagó B1-B6-B12 suspensión	Como posología media de orientación, se aconseja: Lactantes: 2.5 ml 2 ó 3 veces por día. Niños: 5 ml 2 ó 3 veces por día. Adultos: 10 ml 2 ó 3 veces por día.
Bagó B1-B6-B12 inyectable	Como posología media de orientación, se aconseja: 1-2 frasco ampolla por día.
Becozym grageas	Profilaxis: Adultos y adolescentes: 1 gragea por día. Tratamiento: Adultos y adolescentes: 1 gragea, 2-3 veces por día.
Supradyn comp. recubiertos	Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido recubierto por día.
Supradyn gotas	Profilaxis: < 6 años: 6 gotas/día, > 6 años: 12 gotas/día. Carencia: < 6 años: 6 gotas 2 veces por día, > 6 años: 12 gotas 2 veces por día
Tri – vi – flúor gotas	Lactantes y niños hasta 3 años: 0.6 ml. Niños mayores de 3 años: 1.2 ml
Tri – vi – sol gotas	Lactantes nacidos a término: 0.3 ml de solución. Lactantes prematuros: 0.3 ml después de la primera semana aumentándose a 0.6 ml después de la segunda semana. Niños mayores: 0.3 ml o más de solución. Tratamiento de deficiencias: 3 ml o más de solución.