

**POLIVITAMÍNICOS (COMPOSICIÓN)**

NOMBRE COMERCIAL	Vit. B1 (tiamina)	Vit. B2 (riboflavina)	Vit PP (Nicotina mida)	Vit. B6 (piridoxina)	Vit. B5 (D- Pantotenato Cálcico)	Biotina (Vit. H)	Vit. B12 (cianocoba lamina)	Vit. B12 (hidroxoco balamina)	Ácido fólico	Vit.C (ác. ascobico)	Vit.A	Vit.D3 (colecac ciferol)	Vit.D2 (ergocal ciferol)	Vit. E (tocef erol)	Vit.K1
<b>Anemidox® (ampollas) (Amp. I = 1 ml / Amp. II = 2 ml)</b>	100 mg (Amp. II)	0,2 mg (Amp. II)	10 mg (Amp. II)	5 mg (Amp. II)			1 mg (Amp. II)		15 mg (Amp. I)						
<b>Bagó B1-B6-B12 5.000® / Tanvimil B1- B6-B12® (comp. rec.)</b>	125 mg			140 mg			5 mg								
<b>Bagó B1-B6-B12® (solución oral)</b>	5,073 mg/ml			5,566 mg/ml			0,04 mg/ml								
<b>Bagó B1-B6-B12 10.000® (1) (F/A iny.)</b>	100 mg			200 mg				10 mg							
<b>Becozym® (2) (grageas)</b>	15 mg	15 mg	50 mg	10 mg	25 mg	0,15 mg	0,010 mg								
<b>Supradyn® (3) (comp. rec. y comp. efervescente)</b>	1,5 mg	1,7 mg	19 mg	2,2 mg	5,5 mg	0,2 mg	0,003 mg		0,1 mg	60 mg	3333 UI	300 UI		15 mg	
<b>Tri-Vi-Sol® / ADeconCe® / VitADeCe® (4) (gotas)</b>										83 mg/ml	8333 UI/ml		1666 UI/ml		

(1) Bagó B1-B6-B12 10.000®: contiene también lidocaína clorhidrato 20 mg. No administrar por vía endovenosa.

(2) Becozyme®: Contiene lactosa, sacaros, propilenglicol

(3) Supradyn® comprimidos recubiertos y comprimidos efervescentes: contiene también: calcio: 62,5 mg; fósforo: 62,5 mg; magnesio: 50 mg; hierro: 4,5 mg; cobre (sulfato): 0,5 mg; manganeso (sulfato): 0,5 mg; zinc (sulfato): 3,75 mg. Comprimidos efervescentes contienen sorbitol. SIN TACC (4) Tri-Vi-Sol®: Contiene glicerina

NOMBRE COMERCIAL	DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN
Anemidox® (ampollas)	La posología será establecida por el médico en función del proceso a tratar y las características del paciente. Como orientación se sugiere: 1 ampolla I y una ampolla II, juntas (se mezclan en la jeringa con la cual se va a aplicar), por vía I.M. diariamente o día por medio, hasta lograr la remisión de la sintomatología. Esta posología podrá ser aumentada o disminuida de acuerdo a la respuesta individual o al criterio médico.
Bago B1-B6-B12 5.000®/Tanvimil B1-B6-B12® (comp.rec.)	Como posología media de orientación, se aconseja: 1-2 comprimidos recubiertos por día.
Bagó B1-B6-B12® (sol. oral)	Como posología media de orientación, se aconseja: <b>Niños a partir de 1 año:</b> 2,5 a 5 mL 1 a 2 veces por día. <b>Adultos:</b> 10 mL 1 a 2 veces por día.
Bagó B1-B6-B12 10.000® (inyectable)	Como posología media de orientación, se aconseja: 1-2 frasco ampolla por día por vía I.M. profunda exclusivamente.
Becozym® (grageas)	Adultos y niños mayores de 12 años: Profilaxis: 1 gragea por día. Tratamiento: 2-3 grageas por día, dependiendo de la severidad de la deficiencia. Ingerir las grageas sin masticarlas con un poco de agua.
Supradyn® (comp. rec. y comp. efervescente)	<b>Adultos y niños mayores de 12 años:</b> 1 comprimido recubierto o efervescente por día. Comprimidos efervescentes: se debe diluir el comprimido en un vaso de agua antes de ingerirlo.
Tri-Vi-Sol® / ADeconCe® / VitADeCe® (gotas)	<b>Lactantes prematuros:</b> 0,3 mL después de la primera semana, luego aumentar a 0,6 mL después de la segunda semana. <b>Lactantes a término:</b> 0,6 mL por día. <b>Niños mayores de 3 años:</b> 0,6 mL por día. Se puede agregar a jugos frutales, fórmulas lácteas u otros alimentos.